

LOS GRANDES TAMBIÉN SE VACUNAN

TA TU NA NA NO KE NA VACUNA KÉRATICHATUKKI TZINAKUARHSINTI



ENFERMEDAD QUE PREVIENE Y SINTOMAS

CUÁNDO SE PONE

DÓNDE SE PONE

VACUNA

- MENINGITIS**: Calentura, dolor de cabeza fuerte, cuello tieso, dolor de ojos con luces brillantes, sueño, confusión, ascos y vómito muy fuerte. 1 dosis en jóvenes que comparten dormitorio.
- HEPATITIS B**: Ascas y no hay ganas de comer. Ojos y piel amarillos. Orina naranja o café (como Coca-Cola). Calentura y mucha debilidad. 3 dosis con espacio de 1-2, 4-6 meses.
- INFLUENZA** (Gripes): Calentura, dolor de cabeza, cansancio, tos, dolor de garganta, catarro, dolor en todo el cuerpo. A veces hay diarrea y vómito. 1 dosis por año.
- COVID-19** (Coronavirus): Muchas ocasiones no tienes síntomas. Dificultad para respirar, tos, fiebre, pérdida del olfato y gusto. Según la marca: 2 dosis con espacio de 21-28 días o 1 dosis con espacio de 4 a 8 semanas en menores de 49 años.
- VARICELA** (Varicella): Ampollitas con agua que empiezan en cara, siguen en pecho y terminan en brazos y piernas. Al secarse, queda una costra y da mucha comezón.
- SARAMPIÓN** (Measles): Catarro, calentura, tos y diarrea. Salen puntitos rojos en la boca con dolor y salpullido rojo en todo el cuerpo. 2 dosis con espacio de 4 a 8 semanas en menores de 49 años. Y para personas entre 11 y 49 años.
- PAPERAS** (Mumps): Calentura, dolor al abrir la boca o al comer. Hinchazón debajo de las orejas, primero un lado y luego el otro. 1 o 2 dosis en caso de no haber sido vacunado cuando niño (1, 4 y 6 años).
- RUBÉOLA** (Rubella): Se hincha y duele nuca y cuello. Puntitos blancos en boca y después manchas rojas en todo el cuerpo que duran como 5 días.
- DIFTERIA** (Diphtheria): Catarro, calentura, dolor de cabeza y garganta. Puntos grises en garganta, mal aliento e hinchazón de cuello.
- TÉTANOS** (Tetanus): Molestia al tragar, quijada, cuello y otras partes del cuerpo se ponen tiesos. No se puede caminar bien. Dolor fuerte en quijada y todo el cuerpo. 1 dosis cada 10 años después de los 19 años.
- TOS FERINA** (Pertussis): Catarro, calentura, mocos, vómitos, tos frecuente y seca. 3 dosis en espacio de 1-6 meses mínimo si no se puso a los 11-12 años y se aplica hasta los 18.

WHERES TO GET IT: BRAZO derecho, BRAZO izquierdo, PIERNA O BRAZO derecho, BRAZO izquierdo, BRAZO derecho, NALGA.

VACCINES: HB, COVID-19, MENINGOCÓCICA, Tdap, Td, MMR, VAR.

