

¿Cuándo Necesitan sus Vacunas los Niños y los Adolescentes?

Edad	Hep B Hepatitis B (VHB)	DTaP/Tdap Difteria, Tétanos y Tos Ferina	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Polio	PCV Neumocócica conjugada	RV Rotavirus	MMR Sarampión, Parotiditis (Paperas) y Rubéola	Varicela Chickenpox	Hep A Hepatitis A (HAV)	MCV4 Meningocócica conjugada	Influenza (La gripe)
Al nacer	✓										
1 mes	✓										
2 meses		✓	✓	✓	✓	✓					
4 meses	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓					
6 meses	✓	✓	✓ ²	✓	✓	✓					
12-18 meses		✓ (15-18 meses)	✓ (12-15 meses)	✓	✓ (12-15 meses)		✓ (12-15 meses)	✓	✓ ✓ 2 dosis con 6 meses entre cada dosis		✓ ³ (6-59 meses) (anualmente)
19-23 meses											
24-47 meses											
4-6 años		✓		✓			✓				
11-12 años	Ponerse al día ⁴	✓ Tdap								✓	
13-14 años											
15 años		Ponerse al día ⁴ (Tdap/Td)		Ponerse al día ⁴			Ponerse al día ⁴	(los adolescentes no vacunados de 13 años y mayores necesitan 2 dosis)		Ponerse al día ⁴	
16-18 años										¿Va a ir a la ⁵ universidad?	

1. Dependiendo del tipo de vacuna que use su proveedor de salud, es posible que su bebé no necesite la dosis de la vacuna Hepatitis B a los 4 meses de edad.
2. Dependiendo del tipo de vacuna que use su proveedor de salud, es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib a los 6 meses de edad.
3. Si su hijo tiene menos de 9 años y lo van a vacunar por primera vez contra la influenza, debe recibir 2 dosis con al menos 4 semanas entre la primera y la segunda dosis.

4. Si las vacunas de su hijo se retrasan o no se han dado, debe recibirlas lo antes posible.
5. Si tiene un adolescente que asistirá a la universidad y piensa vivir en una residencia estudiantil, también debe vacunarse contra la enfermedad meningocócica.

*Translated by the California Department of Health Services.

Nota: Algunos niños pueden necesitar otras vacunas. Pregunte a su proveedor de salud.

www.immunize.org/catg.d/p4050-01.pdf • Item #P4050-01 (4/06)