

INSTRUCCIONES PARA USAR NALOXONA

(más comúnmente conocida como NARCAN™)



Este medicamento se usa para tratar sobredosis por heroína, fentanilo y medicamentos opioides recetados.



Confirme la sobredosis de opioides y llame al 911

Los signos de una sobredosis de opioides incluyen:

- La persona NO se despierta, aunque le grite, le sacuda por los hombros o le frote con fuerza en la mitad del pecho.
- La respiración es lenta, irregular o se detiene.
- La pupila es muy pequeña, como del tamaño de la punta de un alfiler.

Llame al 911 o pídale a alguien que llame. Ponga a la persona sobre su espalda.



Uso de Naloxona en inhalador

La naloxona se administra con un aerosol nasal que se coloca directamente en la fosa de la nariz. Cada inhalador contiene una dosis.



Sujete el aerosol nasal con el pulgar en el émbolo.



Coloque la punta del inhalador en la fosa nasal. Presione firmemente el émbolo para administrar la dosis de Naloxona.



¡LLAME al 911 si aún no lo ha hecho! Además de Wyoming y Kansas, todos los estados tienen "Leyes del Buen Samaritano".

La naloxona debe hacer efecto en dos o tres minutos. Si la persona no se despierta en tres minutos, utilice otro inhalador para administrar otra dosis. **ES SEGURO SEGUIR ADMINISTRANDO NALOXONA.**

¡QUÉDESE CON LA PERSONA!

Hable con ella y manténgala despierta. Si se duerme, puede aplicarle otra dosis.



El inhalador de Naloxona debe mantenerse a una temperatura entre 2 y 25 grados centígrados (36° F y 77° F) y fuera de la luz directa del sol.

Recomendamos mantenerlo refrigerado. No lo congele ni lo deje en el coche. **Usar un inhalador de Naloxona expirado es mejor que no usar nada.**

Si usted o una persona que conoce corre el riesgo de sufrir una sobredosis, le recomendamos que se informe sobre las Leyes del Buen Samaritano de su estado aquí: pdaps.org/datasets/good-samaritan-overdose-laws-1501695153



LA MAYORÍA DE LOS ESTADOS FACILITAN LA OBTENCIÓN DE NARCAN GRATUITAMENTE.



Para más información consulte: nextdistro.org/naloxone